

Музыкальная терапия может помочь людям с болезнью Альцгеймера
возможность реактивировать психомоторные навыки самого разного характера,
которые они могут быть
исчерпаны или явно отсутствовать. Танцы, обмен инструментами,
петь, участвовать в народных танцах и т. д. может быть отличной возможностью
активировать
психомоторный мозг этих людей нормализованным и мотивирующим образом.

Различные расследования выявили
корреляции улучшения физического здоровья людей с болезнью Альцгеймера
когда они систематически участвуют в сеансах музыкальной терапии (Lindenmuth, G.,
Patel, M., Chang,
P., 1992), (Clair A, Tebb S, Bernstein B., 1994), (Ragneskog H,
Брейн Г., Карлссон И., Кильгрэн, М., 1996), (Фукуи Х, Тойосима К., 2008), (Окада К.,
Курита А.,
Такаса Б., Оцука Т., Кодани Е., Кусама Ю., Атараси Х., Мизуно К., 2009). На В этом
смысле мы
считаем важной роль, которую может сыграть музыкальная терапия. в замедлении
болезни Альцгеймера,
особенно у пациентов
обнаруживается на ранних стадиях болезни.

ТАБЛИЦА 7. 5. Психомоторная область музыкальной терапевтической системы оценки для людей с
 Альцгеймера и других деменций.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЙ	Предметы
Координация	Идеальное телосложение	8
	Психомоторная саморегуляция	4
	Ритмическая координация	4
	Двусторонняя координация	6
Контур тела	Расположение и идентификация частей тела	5
	Активные отношения с космосом	2
Мелкой моторики	Сенсорная интеграция	2
	Захват предметов (захват / отпуск)	2
	Манипулирование объектами	2
Праксис	Выполнение идеомоторной практики	3
	Выполнение идейной практики	4

Источник: https://crealzheimerserso.es/InterPresent2/groups/imsero/documents/binario/21021_sempa.pdf